S-1/CDDP 2-B（低用量）療法の投与スケジュール　　1クール 35日間

Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
内服 エスワンタイホウ ※投与量：表面の表1参照	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕													

① or ❷　　③

注射

生理食塩液 100mL
ルートキープ

ソリューゲンG500mL 1瓶
プリンペラン10mg 1管
硫酸Mg補正液 8mL
点滴静注 120分

ソルデム3A 500mL 1袋
点滴静注 120分
【※day9のみ】

ソリューゲンG500mL 1瓶
プリンペラン10mg 1管
点滴静注 120分
【※day9のみ】

ソルデム3A 500mL 1袋
ラシックス20mg 1管
点滴静注 120分

グラニセトロン3mg／100mL
デカドロン 16.5mg
点滴静注 30分

シスプラチン
投与量：表1を参照
生理食塩水 400mL
点滴静注 120分

ソリューゲンG500mL 1瓶
プリンペラン10mg 1管
点滴静注 120分

ソルデム3A 500mL 1袋
点滴静注 120分

ソリューゲンG500mL 1瓶
点滴静注 120分

day8にアプレピタントカプセルを併用する際、ソルデム3A 500mL+ラシックス20mgを投与開始時に内服

*アプレピタントカプセルセットを服用時には、デカドロン注は16.5mg→9.9mgに減量

デカドロン 6.6mg 1管
デカドロン 3.3mg 1管

生理食塩水500mL 1袋
点滴静注 150分

11時00分
6時00分
8時00分
10時00分
13時00分
15時00分
15時30分
17時30分
19時30分
21時30分

【※注意】シスプラチン投与中は尿量確保に注意し、必要に応じてマンニトール等の利尿剤を投与すること。尿量は、投与当日は3000mL、投与後3日間は1500mL以上の尿量を確保することが望ましい。