

	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
① or ②															
点滴注射		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 200px;"> 生理食塩液 100mL (ルートキープ) ※シリンジで10mLを抜き取り、最初に逆血確認後にフラッシュ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 200px; margin-left: 10px;"> パロノセトロン 0.75mg/50mL デカドロン6.6mg 1管 点滴静注 30分 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 200px; margin-left: 10px;"> オニバイド 70 mg/m² 5%ブドウ糖 500mL 点滴静注 90分 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 200px; margin-left: 10px;"> 5%ブドウ糖注 100 mL (ルートフラッシュ) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 200px; margin-left: 10px;"> レボホリナート 200 mg/m² 5%ブドウ糖注 250 mL 点滴静注 120分 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 200px; margin-left: 10px;"> 5%ブドウ糖注 100 mL (ルートフラッシュ) </div> </div>													
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: auto;"> 1本の 5%ブドウ糖注 100mLを50mL ずつ使用する。 </div>													
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: auto;"> インフューザーポンプ </div>													
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: auto;"> 5-FU 2400 mg/m² 5%ブドウ糖 ※2 持続点滴静注 46時間 </div>													
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: auto;"> 46時間後に抜針 (外来:基本的には 外来化学療法室で抜針) </div>													
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: auto;"> 抜針時 生理食塩液 10mLでポート フラッシュ </div>													