

乳TC療法の投与スケジュール

1クール 21日間

|      |  | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
|------|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 経口投与 | <p>【末梢性浮腫予防】<br/>デカドロン錠4mg 2錠<br/>分2 朝夕食後</p> <p>※不眠時には朝昼食後で内服</p>                             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|      | <p>【抗生物質】<br/>レボフロキサシン錠500mg<br/>頓服</p> <p>※発熱時 38度以上で<br/>1錠内服し連絡して来院する。<br/>(念の為、3日分処方。)</p> |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 点滴注射 | 生理食塩液 100mL<br>(ルートキープ)  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|      | デカドロン 6.6mg 1管<br>グラニセトンバック 100mL<br>点滴静注 30分  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|      | ドセタキセル 75mg/m <sup>2</sup><br>5%ブドウ糖注 250mL<br>点滴静注 60分<br>【滴数を1.4倍にして投与する】                    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|      | エンドキサン 600mg/m <sup>2</sup><br>5%ブドウ糖注 250mL<br>点滴静注 60分                                       |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|      | 生理食塩液 100mL<br>(ルートフラッシュ)  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
|     | 朝食後 | 朝食後 | 朝食後 |
| 夕食後 | 夕食後 | 夕食後 |     |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |