ツカチニブ＋カペシタビン＋トラスツズマブ療法の投与スケジュール　　1クール　21日間

Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
経口投与	ツカイザ錠　600mg　分2　朝夕食後 【連日投与】	朝夕食後	朝夕食後	朝夕食後	朝夕食後	朝夕食後	朝夕食後	朝夕食後	朝夕食後	朝夕食後	朝夕食後	朝夕食後	朝夕食後	朝夕食後	朝夕食後	朝夕食後	朝夕食後	朝夕食後	朝夕食後	朝夕食後	朝夕食後
	カペシタビン錠（300mg）　分2　朝夕食後		朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後						
		夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後							

体表面積	1日用量
1.36m^{2}未満	2,400mg
1.36m^{2}以上1.66m^{2}未満	3,000mg
1.66m^{2}以上1.96m^{2}未満	3,600mg
1.96m^{2}以上	4,200mg

点滴注射

生理食塩液　100mL
（ルートキープ）

【初回】
トラスツズマブ　8mg／kg
生理食塩液　250mL
点滴静注　90分

【2回目以降】
トラスツズマブ　6mg／kg
生理食塩液　250mL
点滴静注　30分
（初回で忍容性が良好な場合）

生理食塩液　100mL
（ルートフラッシュ）

1本の生理食塩液
100mLを使用する