

CDDP/VP-16の投与スケジュール

1クール 21日間

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	アプレピタントカプセル		125mg	80mg	80mg																		
	【※糖尿病既往なしに限る】 オランザピン錠 5mg 分1 寝る前																						

① or ②

③

注射

生理食塩液 100mL
点滴静注 ルートキープ

ソルアセトD 500mL 1瓶
プリンペラン10mg 1管
硫酸Mg補正液 8mL
点滴静注 120分

ソルデム3A 500mL 1袋
点滴静注 120分

パロノセトロン 0.75mg／50mL
デカドロン 6.6mg 1管
デカドロン 3.3mg 1管
点滴静注 30分

生理食塩液 100mL
デカドロン 6.6mg 1管
点滴静注 30分
【day2.3のみ】

ベプシド 100mg/m2
5%ブドウ糖注 500mL
点滴静注 90 分
【滴数を1.4倍にして投与する(適宜調整)】

ラシックス注 20mg 1管
生理食塩液 100mL
点滴静注 15分

シスプラチン 70mg/m²
生理食塩液 400mL
点滴静注 120分

ソルアセトD 500mL 1瓶
プリンペラン10mg 1管
点滴静注 120分

ソルデム3A 500mL 1袋
点滴静注 120分

ソルアセトD 500mL 1瓶
点滴静注 120分

生理食塩液 100mL
点滴静注 ルートフラッシュ

day1のアプレピタントカプセルは、ソルデム3A500mLを投与開始時に内服する。

【※注意】シスプラチン投与中は尿量確保に注意し、必要に応じてマンニトール等の利尿剤を投与すること。尿量は、投与当日は3000mL、投与後3日間は1500mL以上の尿量を確保することが望ましい。

生理食塩液 500mL 1袋
点滴静注 120分

day1のアプレピタントカプセルは、メイン②のソルデム3A 500mLを投与開始時に内服する。day2,day3は、day1と同じ位の時間に内服する。