

CBDCA/PTX 1-A(一括投与法)療法の投与スケジュール

1クール 21日間

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

経口投与	レスタミンコーワ (50mg)	5錠																				
	1本目の前投薬(デカドロン+ファモチジン+生理食塩液)を開始と同時に服用する。																					
	アプレピタントカプセル 分1 点滴開始時に内服	125mg	80mg	80mg																		

※アプレピタントカプセルの2日目、3日目の内服は、1日目と同じ位の時間に内服する。

(※アプレピタントカプセルの服用は、レスタミンコーワと同時に125mgカプセルを服用する。2日目、3日目は1日目に服用した時間と同じ位の時間に80mgカプセルを1カプセル服用する。)

点滴注射	生理食塩液 100mL (ルートキープ)																				
	デカドロン注 19.8mg ファモチジン注 20mg 1管 生理食塩液 100mL 点滴静注 30分	※同時にレスタミンコーワを内服																			
	グラニセトロン3mgバック100mL 点滴静注 30分																				
	パクリタキセル 200mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 500mL 点滴静注 180分 【滴数を1.6倍にして投与する】																				
	カルボプラチン AUC 6 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分																				
	プリンペラン 10mg 1管 ソルデム3A輸液 200mL 点滴静注 30分																				