## 非小細胞肺ドセタキセル療法の投与スケジュール

1クール 21日間

| | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経口投与 | 【末梢性浮腫予防】<br>デカドロン錠4mg 2錠<br>分2 朝夕食後<br><br>※不眠時には朝昼食後で内服 | 夕食後 | 朝食後<br>夕食後 | 朝食後<br>夕食後 | 朝食後 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 【抗生物質】<br>レボフロキサシン錠500mg 1錠<br>頓服<br>※発熱時 38度以上で<br>1錠内服し連絡して来院する。<br>（念の為、3日分処方。） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 点滴注射 | 生理食塩液 100mL<br>（ルートキープ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | グラニセトロン3mgバック100mL<br>デカドロン6.6mg 1管<br>点滴静注 30分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ドセタキセル 60mg/m2<br>5%ブドウ糖注 250mL<br>点滴静注 60分<br>【滴数を1.4倍にして投与する】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生理食塩液 100mL<br>（ルートフラッシュ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |