

CBDCA/PTX/ベバシズマブ9-A(一括投与法)療法の投与スケジュール

1クール 21日間

Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
経口投与	レスタミンコーワ(10mg) 5錠 1本目の前投薬(デカドロン+ファモチジン+生理食塩水)の開始と同時に服用する。	5錠																			
	アプレピタントカプセル 分1 点滴開始時に内服	125mg	80mg	80mg																	

※アプレピタントカプセルの2日目、3日目の内服は、1日目と同じ位の時間に内服する。

点滴注射	生理食塩液 100mL ルートキープ																					
	デカドロン注 19.8mg ファモチジン注 20mg 1管 生理食塩液 100mL 点滴静注 30分																					
	グラニセトロン3mg/バック100mL 点滴静注 30分																					
	パクリタキセル 200mg/m ² 生理食塩液 500mL 点滴静注 180分間																					
	カルボプラチン AUC 6 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分																					
	プリンペラン 10mg 1管 ソルデム3A輸液 200mL 点滴静注 30分																					
	生理食塩液 100mL ルートフラッシュ																					
	ベバシズマブ 15mg/kg 生理食塩液 100mL 点滴静注 1回目 90分 2回目 60分 3回目以降 30分																					
	生理食塩液 100mL ルートフラッシュ																					

1本の生理食塩液を使用する。