

CBDCA/S-1療法の投与スケジュール

1クール 21日間

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

経口投与	<b>エスワンタイホウ配合OD錠</b>	
	<b>体表面積(m<sup>2</sup>)</b>	<b>投与量</b>
	1.5以上	60mg/回(120mg/日)
	1.5> ≥1.25	50mg/回(100mg/日)
	1.25未満	40mg/回(80mg/日)
アプレピタントカプセル 分1 カルボプラチン開始の1時間前に内服		

	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後	朝食後
夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後	夕食後
125mg	80mg	80mg																			

※アプレピタントカプセルの2日目、3日目の内服は、1日目と同じ位の時間に内服する。

点滴注射	生理食塩液 100mL (ルートキープ用)	
	グラニセトロン3mgバック100mL デカドロン6.6mg 1管 点滴静注 30分	
	カルボプラチン AUC5 5%ブドウ糖注 250mL 点滴静注 60分	
	生理食塩液 100mL (ルートフラッシュ用)	