

CBDCA/PEM/ペムプロリズマブ療法の投与スケジュール

1クール 21日間

Day	↓初回の7日前より	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	最終投与日より 22日目まで↓
経口投与	フロリアミン錠5mg 0.1錠 1日1回経口投与	アリムタの初回投与7日前～最終投与22日目まで可能な限り投与する。																					
筋肉注射	メコバラミン注(500μg/1mL) 2管 1日1回 筋肉注射	投与7日 以上前 に投与 以後9週毎																					
点滴注射	生理食塩液 100mL 点滴静注 ルートキープ																						
	デカドロン 6.6mg グラニセトロンバック 3mg/100mL 点滴静注 30分																						
	生理食塩液 100mL 点滴静注 ルートフラッシュ																						
	キイトルーダ 200mg 生理食塩液 100mL 点滴静注 30分																						
	生理食塩液 100mL 点滴静注 ルートフラッシュ																						
	アリムタ 500mg/m ² 生理食塩液 100mL 点滴静注 10分																						
	カルボプラチン AUC 5 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分																						
	生理食塩液 100mL 点滴静注 ルートフラッシュ																						

1本の
生理食塩液を
使用する。

1本の
生理食塩液を
使用する。