

シスプラチン+ペトレキセド+ペムブロリズマブ療法の投与スケジュール(1～4コース)

1クール 21日間

		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	最終投与日より 22日目まで↓
経口投与	アプレピタントカプセル 【キイトルーダ投与開始時に内服】		125 mg	80mg	80mg																			
	デカドロン錠4mg 2錠 分1 朝食後																							
	【※糖尿病既往なしに限る】 オランザピン錠5mg 分1 寝る前																							
	フォリアミン錠5mg 0.1錠 1日1回経口投与		ペトレキセドの初回投与7日前～最終投与22日目まで可能な限り投与する。																					
筋肉注射		メコバラミン注射液(500μg/1mL)2 管 1日1回 筋肉注射	投与7日 以上前 に投与 以後9週毎																					
注射	① or ②	③																						
	ソルアセットD500mL 1瓶 プリンペラン10mg 1管 硫酸Mg補正液 8mL 点滴静注 120分																							
	ソルデム3A 500mL 1袋 点滴静注 120分																							
	生理食塩液 100mL 点滴静注 ルートフラッシュ																							
	キイトルーダ 200mg 生理食塩液 100mL 点滴静注 30分																							
	生理食塩液 100mL 点滴静注 ルートフラッシュ																							
	パロノセトロン0.75mg/50mL デカドロン 6.6mg 1管 デカドロン 3.3mg 1管 点滴静注 30分																							
	ペトレキセド 500mg/m ² 生理食塩液 100mL 点滴静注 10分																							
	ラシックス注 20mg 1管 生理食塩液 100mL 点滴静注 15分																							
	シスプラチン75mg/m ² 生理食塩液 400mL 点滴静注 120分間																							
	ソルアセットD500mL 1瓶 プリンペラン10mg 1管 点滴静注 120分																							
	ソルデム3A 500mL 1袋 点滴静注 120分																							
	ソルアセットD500mL 1瓶 点滴静注 120分																							

day1のアプレピタントカプセルは、キイトルーダの点滴開始時に内服する。Day2,day3は、day1と同じ位の時間に内服する。