

1クール 21日間

筋肉注射	メコバラミン注(500 μ g/1mL)2管 1日1回 筋肉注射	投与7日 以上前 に投与 <u>以後9週毎</u>
------	---	------------------------------------

注射

① or ②

③

ソルアセトD500mL 1瓶 プリンペラン10mg 1管 硫酸mg補正液 8mL 点滴静注 120分
ソルデム3A 500mL 1袋 点滴静注 120分
生理食塩液 100mL ルートフラッシュ
テセントリク 1200mg 生理食塩液 100mL 点滴静注 1回目 60分 2回目以降 30分
生理食塩液 100mL ルートフラッシュ
パロノセトロン0.75mg／50mL デカドロン 6.6mg 1管 デカドロン 3.3mg 1管 点滴静注 30分
ペメトレキセド 500mg/m2 生理食塩液 100mL 点滴静注 10分
ラシックス注 20mg 1管 生理食塩液 100mL 点滴静注 15分
シスプラチン 75mg/m2 生理食塩液 400mL 点滴静注 120分
ソルアセトD500mL 1瓶 プリンペラン10mg 1管 点滴静注 120分
ソルデム3A 500mL 1袋 点滴静注 120分
ソルアセトD500mL 1瓶 点滴静注 120分

day1のアプレピタントカプセルは、テセントリク投与開始時に内服する。

1本の生理食塩液を使用する。

生理食塩液500mL 1袋
点滴静注 120分

【※注意】シスプラチン投与中は尿量確保に注意し、必要に応じてマンニトール等の利尿剤を投与すること。尿量は、投与当日は3000mL、投与後3日間は1500mL以上の尿量を確保することが望ましい。

PEM＋アテゾリズマブ維持療法の投与スケジュール		1クール 21日間																					最終投与日より 22日目まで↓			
Day		↓初回の7日前より	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
経口投与	フォリアミン錠5mg 0.1錠 1日1回経口投与	ペメトレキセドの初回投与7日前～最終投与22日目まで可能な限り投与する。																								
筋肉注射	メコバラミン注射液(500μg／1mL)2管 1日1回 筋肉注射	投与7日以上前に投与 以後9週毎																								
点滴注射	生理食塩液 100mL ルートキープ																									
	テセントリク 1200mg 生理食塩液 100mL 点滴静注 1回目 60分 2回目以降 30分																									
	生理食塩液 100mL ルートフラッシュ																									
	デカドロン 6.6mg グラニセトロン3mgバック 100mL 点滴静注 30分																									
	ペメトレキセド 500mg/m2 生理食塩液 100mL 点滴静注 10分																									
	生理食塩液 100mL ルートフラッシュ																									