

CBDCA+nab-PTX+アテゾリズマブ療法の投与スケジュール

1クール 21日間

		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
注射薬	生理食塩液 100mL ルートキープ																						
	テセントリク 1200mg 生理食塩液 100mL 点滴静注 1回目 60分 2回目以降 30分																						
	生理食塩液 100mL ルートフラッシュ																						
	デカドロン注 6.6mg 1管 グラニセトロンバック3mg/100mL 点滴静注 30分																						
	生理食塩液 100mL ルートフラッシュ																						
	生理食塩液 100mL プライミング																						
	アブラキサン 100mg/m ² 1バイアルあたり 生理食塩液 20mLで調製 点滴静注 30 分																						
	生理食塩液 100mL ルートフラッシュ																						
	カルボプラチン AUC6 5%ブドウ糖注 250mL 点滴静注 60分																						
	生理食塩液 100mL ルートフラッシュ																						

1本の
生理食塩液を
使用する。

1本の
生理食塩液を
使用する。

～制吐剤についての注意～

アプレピタントカプセルを服用する際には、125mgカプセルを【グラニセトロンバック+デカドロン注6.6mg】の点滴開始と同時に服用する。
2日目、3日目は1日目に服用した時間と同じ位の時間に80mgカプセルを1カプセル服用する。
なお、8日目、15日目のアブラキサン単独にはアプレピタントカプセルは使用しないこと。
アブラキサンは、前投薬が必要ないことが特徴である抗癌剤であるが、もし悪心が出現した患者には、次回より【生理食塩液+デカドロン注6.6mg】を考慮する。

アテゾリズマブ維持療法の投与スケジュール

1クール 21日間

[illegible]