		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
内服	プレドニン内服 60mg/m² (※イメンドカプセルを服用する際には、アドリアシン	】 股与1時間	前に125	imgカフ	゚゚セルを゙゚	服用す	る。2日	目、3日	3目は1	日目に	こ服用し	た時間	き同じ	.位の問	持間に8	0mgカフ	プセル	を1カプ	゚セル服	用する	ı。)		
注射	生理食塩液100mL (ルートキープ) ソル・コーテフ 100mg ポララミン 5mg 生理食塩液 100mL 点滴静注 30分 リツキシマブ 375 mg/m2 生理食塩液 500mL 点滴静注 ◆初回 最初の30分は50mg/時 その後、30分毎に50mg/時ずつ上げて 最大400mg/時まで可能 ◆2回目以降 最初の30分は100mg/時 その後30分毎に100mg/時ずつ上げて																						
	最大400mg/時まで可能 生理食塩液100mL (ルートフラッシュ) 生理食塩液100mL (ルートキープ) グラニセトロンバック3mg/100mL 点滴静注 30分																						
	アドリアシン 50 mg/m ² 生理食塩液 100mL 点滴静注 30分 オンコビン 1.4 mg/m ² 生理食塩液 50mL 点滴静注 15分 エンドキサン 750 mg/m ² 5%ブドウ糖注 250mL 点滴静注 60分 生理食塩液100mL (ルートフラッシュ)	_			- -																		