DCyBorD療法の投与スケジュール

1クール　28日間

1～2コース

		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
経口投与	レナデックス錠4mg 1日1回　5錠　ダラキューロ投与1時間前または 朝食後		■	■						■	■						■	■						■	■					
	アセトアミノフェン錠 200mg 1日1回 3錠 ダラキューロ投与1時間前		■							■							■							■						
	フェキソフェナジン錠 60mg 1日1回 1錠 ダラキューロ投与1時間前		■							■							■							■						
	モンテルカスト錠 10mg 1日1回 1錠 ダラキューロ投与1時間前（初回のみ）		■																											
皮下注射	ダラキューロ配合皮下注　1800mg（15mL） 皮下注射　3～5分		■							■							■							■						
経口投与	エンドキサン錠　300mg/m^2 1日1回		■							■							■							■						
皮下注射	ボルテゾミブ注　1.3mg/m2 生理食塩液 ボルテゾミブ注3mg1瓶あたり1.2mLで溶解 皮下注射		■							■							■							■						

3～6コース

		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
経口投与	レナデックス錠4mg 1日1回　5錠　ダラキューロ投与1時間前または 朝食後		■	■						■	■						■	■						■	■					
	アセトアミノフェン錠 200mg 1日1回 3錠 ダラキューロ投与1時間前		■														■													
	フェキソフェナジン錠 60mg 1日1回 1錠 ダラキューロ投与1時間前		■														■													
皮下注射	ダラキューロ配合皮下注　1800mg（15mL） 皮下注射　3～5分		■														■													
経口投与	エンドキサン錠　300mg/m^2 1日1回		■							■							■							■						
皮下注射	ボルテゾミブ注　1.3mg/m2 生理食塩液 ボルテゾミブ注3mg1瓶あたり1.2mLで溶解 皮下注射		■							■							■							■						

7コース～

		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
経口投与	レナデックス錠4mg 1日1回　5錠　ダラキューロ投与1時間前または 朝食後		■																											
	アセトアミノフェン錠 200mg 1日1回 3錠 ダラキューロ投与1時間前		■																											
	フェキソフェナジン錠 60mg 1日1回 1錠 ダラキューロ投与1時間前		■																											
皮下注射	ダラキューロ配合皮下注　1800mg（15mL） 皮下注射　3～5分		■																											