術前：デュルバルマブ+GC(ゲムシタビン+シスプラチン)Ccr40以上60未満投与スケジュール

		1		2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
内服	アプレピタントカプセル内服	125mg シスプラチン 投与1時間前		80mg 前日と同じ時間	80mg 前日と同じ時間					125mg シスプラチン 投与1時間前		80mg 前日と同じ時間	80mg 前日と同じ時間											
注射	生理食塩液　100mL（ルートキープ）																							
	イミフィンジ 1500mg 生理食塩液　250mL 点滴静注　60分																							
	生理食塩液　100mL（ルートフラッシュ）																							
	パロノセトロン 0.75mg/50mL デカドロン 6.6mg　1管 デカドロン 3.3mg　1管 点滴静注　30分																							
	ゲムシタビン 1000mg/m^2 5%ブドウ糖液 100mL 点滴静注30分 【副作用増強の可能性があるため時間厳守】																							
	生理食塩液　100mL（ルートフラッシュ）																							
	ソルアセトD500mL　1袋 プリンペラン10mg　1管 硫酸Mg補正液　8mL 点滴静注　120分																							
	ラシックス20mg　1管 生理食塩液100mL　1袋 点滴静注　30分																							
	シスプラチン 35mg/m^2 生理食塩液 400mL 点滴静注120分																							
	ソルアセトD500mL　1袋 プリンペラン10mg　1管 点滴静注　120分																							
	ソルデム3A 500mL　1袋 点滴静注　120分																							
	ソルアセトD500mL　1瓶 点滴静注　120分																							
	ソルデム3A 500mL　1袋 デカドロン注　6.6mg 点滴静注　120分																							
	ソルアセトD500mL　1袋 プリンペラン10mg　1管 点滴静注　120分																							

生理食塩液100mL を約50mLずつ使用

生理食塩液　500mL　1袋 点滴静注　120分

術前最大 4コース

術後：イミフィンジ投与スケジュール

	1		2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
生理食塩液　100mL（ルートキープ）																													
イミフィンジ 1500mg 生理食塩液　250mL 点滴静注　60分																													
生理食塩液　100mL（ルートフラッシュ）																													

術後最大 8コース