脳テモゾロミド療法の投与スケジュール

テモゾロミド内服の場合

1コース目　70日間

	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	～	70
経口	メトクロプラミド錠5mg※ 1日1回　1回2錠 起床時																																													
	テモゾロミドカプセル **1日1回　75mg/m²** **朝食前**																																													
	バクタ錠※※ 1日1回　1回1錠 連日又は週3日　経口																																													
放射線	1回 2.0Gy 週5日　6週間　（総線量 60Gy）																																													

テモゾロミド点滴静注の場合

	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	～	70
経口	バクタ錠※※ 1日1回　1回1錠 連日又は週3日　経口																																													
点滴	生理食塩液　100mL ルートキープ																																													
	プリンペラン注10mg※ 生理食塩液 100mL 点滴静注　30 分																																													
	テモゾロミド点滴静注用 **75mg/m2** **生理食塩液　　mL** **【全量を250mLとする】**																																													
	生理食塩液　100mL ルートフラッシュ																																													

テモゾロミド内服の場合

2～7コース目　28日間

	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
経口	カイトリル錠1mg 1日1回　1回2錠 起床時																												
	テモゾロミドカプセル **1日1回　150～200mg/m²** **（※2コース目は150mg/m²）** **朝食前**																												

テモゾロミド点滴静注の場合

	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	生理食塩液　100mL ルートフラッシュ																												
	グラニセトロンバッグ 3mg/100mL 点滴静注　30 分																												
	テモゾロミド点滴静注用 **150～200mg/m²** **生理食塩液　　mL** **【全量を250mLとする】** **（※2コース目は150mg/m²）**																												
	生理食塩液　100mL ルートフラッシュ																												